Rapport sur la situation des malades atteints d'abcès au fondement par Mr Maune

Mr Maune persuadé que les accidens qui accompagnent ordinairement les abcès du fondement dependent du croupissement du pus, qui vient de ce que les malades sont couchés sur le dos ou sur un des cotés, dit que pour éviter ce croupissement et les mauvais effets qui en resultent, la situation la plus favorable est celle où les malades sont assis sur un grand bourrelet ayant le dos légérement panché en arrière, les cuisses et les jambes flechies et les jarrets soutenus par un traversin il assûre que par cette situation, on guerira promptement et surement la plus grande partie des Depots au fondement, si l'on fait attention de faire des incisions convenables, et des pansements methodiques. Mr Maune dit avoir obtenu plusieurs succès heureux par ce moyen il en cite un des plus remarquables, où il s'agit d'un depot considerable qu'il a ouvert par une incision oblique faite a six lignes de la marge de l'anus. ayant remarqué que sa cavité étoit tres profonde et que l'intestin étoit denudé dans une grande étendue, il dit qu'il vit que c'étoit la un de ces cas où presque tous les praticiens font une longue incision a coté de la marge de l'anus, après laquelle quelques uns incisent l'intestin et d'autres en emportent une

ARC 56
n° 91

partie, quil crut devoir sécarter de ces pratiques
ennes, quil ne voulut pas meme se contenter de
faire une seule ouverture comme prescrit
Mr Joubert parce quelle ne lui parut pas
suffisante pour obvier au croupissement du pus.
voicy sa conduite, il porta une sonde canelée
dans la playe en la dirigeant vers le periné ou
le foyer de labcès sétendoit et il fit une contre
ouverture a coté dela partie anterieure de lanus
ces deux playes pansées, il met le malade en
situation, et il guerit promptement.
quoique Mr Hamne ait obtenu plusieurs succes heureux
je ne vois pas quon puisse les attribuer aux moyens
quil a employé; il les ~~doit~~ plutot a ce quil na
eu a traiter que des abcès simples qui guerissent
promptement et surement en se contentant de
faire comme le prescrit Mr Joubert une incision
seulement pour levacuation du pus. on trouve
dans son memoire six a sept observations
dabcès considerables qui ont guerri en peu de
temps par cette seule ouverture. dans mon
memoire sur les grands abcès au fondement jen
ai rapporté aussi plusieurs ~~qui~~ tous les faits rendent
incontestable le precepte de M Joubert, et suffisent pour
prouver que les incisions multipliées ainsi que
la situation assise qui doit etre a la longue
insupportable ne conviennent nullement dans
le traitement des abcès simples.

on ne peut non plus retirer aucun avantage de ces moyens pour operer la cure des abcès compliqués de crevasse a l'interieur. les accidens qui sont les suites ordinaires de ces sortes d'abcès, ne dependent point du croupissement du pus. ils sont produits par les humidités stercorales qui passent continuellement par cette crevasse qu'il faut la detruire, pour lors on est sur d'obtenir une guerison prompte soit que les malades restent couchés sur le dos, ou sur un des cotés.

Les abcès produits par la crevasse du canal de l'urethre ont quelquefois leur siege au fondement la situation et les incisions multipliées n'y peuvent rien non plus. je n'en rapporterai pas icy les raisons croyant en avoir deja assez dit pour faire voir que les moyens proposés par Mr Maune ne peuvent convenir dans aucun cas d'abcès au fondement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Rapport sur l'utilité dela compression et dela Situation dans les grands abcès compliqués de Denudation des os par Mr Manne

pour Demontrer l'utilité dela compression et dela Situation dans les grands abcès compliqués de denudation des os Mr Manne donne deux observations; dans la 1ere il parle d'une personne qui fut blessé par un Eclat, de bois qui lui fit une playe considerable ala partie externe superieure presque moyenne dela cuisse droite et fractura le femur. ce qui fut suivi d'accidens graves qui rendirent le traitement fort long. la cuisse est restée plus courte que l'autre de quatre travers de doigts, la fracture n'ayant pas eté reduite il survint a cette partie dela cuisse a dix neuf ans de distance l'un de l'autre deux depots considerables auxquels Mr Manne fit des ouvertures et contreouvertures, ayant trouvé chaque fois l'os denudé dans une grande etendue a l'endroit dela reunion des extremités des os qui chevauchoient l'un sur l'autre, il employa la compression qu'il fit au moyen d'un Bandage circulaire qui recouvroit toute la cuisse a l'exception des Endroits ou il avoit fait les incisions. il situa le malade de manière a favoriser la sortie du pus. le moyen a reussi chaque fois et la reunion fut parfaite en peu de tems.

dans la seconde observation qui n'est point

detaillée, il s'agit d'un depot derriere et au dessus de l'oreille gauche que Mr Maune ouvrit. ayant trouvé le pericrane detaché dans une assez grande etendue, il fit des pansements compressifs et cette maladie guerit en tres peu de tems sans exfoliation

Mr Maune a suivi comme il le dit les preceptes donnés pour tacher de faire adherer les os denudés avec les parties voisines. le succès heureux qu'il a obtenu dans sa premiere observation me paroit etonnant. on doit avoir peine a concevoir comment la surface d'un os deux fois denudée par un depot, et qui avoit deja souffert par les effets d'une fracture mal reduite + ait pu etre assez sain pour se reunir aussi facilement aux parties voisines. cette observation merite d'etre conservée elle fait voir combien sont grandes les ressources de la nature lorsqu'elle est aidée par l'art

[margin: + tre se soit par exfolie,]

Peron

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 56
n° 91